Employée.

Observation

Sur L'Ecrasement de deux doigts dont Les ós estoient fracturés, Et L'Extremité des tendons Extenseurs dechirés, avec perte de Substance.

Le vingt six novembre mil sept cent trente et un on m'amena Le Sieur Lonchamps menuisier, qui en prenant des mesures pour certains ouvrages de La pompe du pont notre Dame, avoit inconsiderement posé sa main gauche sur La carne d'une poutre, à deux Lignes et demie de Laquelle + passoit L'angle d'une manivelle de fer qui pour Lors estoit en mouvement.

devoit

Le doigt Indicateur, celuy du milieu, et L'annulaire avoient Esté si fortement comprimez, que Les tendons Extenseurs de ces deux derniers estoient dechirez de maniere quil y avoit ~~au moins dix lignes de~~ perte de Substance en Leurs Extremitez d'environ dix Lignes. ~~en Longueur~~

Les articulations de leurs dernieres phalanges etoient decouvertes, dans leur partie externe, et presque toute La peau en estoit detruite depuis La partie moyenne Jusqu'à La racine de L'ongle, a La reserve de quelques petites portions tres contuses et meme Livides, qui estoient rebroussées Le Long des parties Laterales: A La partie Interne de ces 2 doigts La peau etoit seulement divisée et comme fendue presqu'en droite Ligne, a peu pres dans La

ARC 42 n° 69

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

meme Etendue.

Le doigt du milieu, n'estoit fracturé qu'a sa derniere phalange,
mais L'annulaire estoit Ecrasé depuis Le milieu de sa seconde
phalange jusqu'a L'Extremité de La derniere, et La
pluspart des fragmens de celle cy, estoient hors de Leur
place. La blessure de L'indicateur, n'avoit rien d'Extraordinaire.
Lorsque j'eus reconnu tout ce desordre, j'en sentis toute La
Consequence; J'apréhenday de ne pouvoir conserver
L'Extremité de ces deux doigts, ou du moins La mobilité de
leurs phalanges, parce que + ~~j'etois incertain de quelle maniere~~
~~Les tendons se delibileroient~~ si La réunion des os se
pourroit faire sans ankylose.

+ j'ignorois a quoy Les tendons pourroient s'attacher et

Je pançay d'abord Le doigt annulaire, j'en ajustay autant
qu'il me fut possible, toutes Les pieces osseuses, mais je ne pus ~~[illegible]~~
aprocher la portion restante du tendon que jusqu'au bord
de L'articulation decouverte, puisqu'il y avoit perte de substance.
Je rassemblay ensuite ce qui restoit de la peau, j'en
couvris une partie du tendon, et Les parties Laterales de
L'articulation; Le tout fut maintenu dans cette situation
par une compresse apliquée sur Le doigt suivant La route
du tendon, par un bandage mediocrement serré, et Le
reste de L'apareil a L'ordinaire.

La meme conduite fut observée dans Le pancement du
doigt du milieu, et toute La main fut couverte d'une
compresse trempée dans un defensif: Le malade fut mis
au Lit, sa main posée sur un coussin, elevée selon Les regles
de L'art, et il fut saigné copieusement et tres frequemment.

Je ne Levay L'apareil que quarante huit heures apres; Je trouvay une Legere Erysipele sur Le dos de La main. Je renouvellay Le defensif et continuay Les saignées Luy prescrivant toujours une diete des plus severes; Et L'erysipele se termina en quatre jours.

Ce qui m'jnquieta Le plus fut un Ecoulement de Synovie que j'apercus au second pansement, qui venoit de La derniere articulation de L'annulaire; Je craignois que ce ne fust dans La suite un obstacle a La reunion, ou du moins que cette Jointure ne s'ankylosast; neanmoins cet Ecoulement diminua peu a peu et disparut entierement Le dixieme jour: Il restoit une douleur tres aigue a La partie Laterale et Externe de cette articulation qui tourmentoit tellement Le blessé qu'il me sollicitoit a chaque pancement, d'y faire jncision. Je resistay a ses Instances, mais j'aprehendois fort qu'il ne perdist cette phalange, tant a cause de cette douleur opiniastre que par rapport ~~au~~ ~~defaut~~ peu de solidité de La jointure qui n'etoit retenuë que par ~~Le peu de~~ Ce ~~peau~~ qui restoit de peau aux parties Laterales et a La partie jnterne de ce doigt.

Cependant cette douleur se modera, et diminua peu a peu, Une chair Loüable et grainuë qui s'elevoit sur La surface des os recouvrit L'articulation, et La peau se reunifioit d'une façon satisfaisante.

+ ~~peau~~

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Lorsque je vis Les ~~A~~rticulations bien recouvertes, je commencay a flexir ces deux doigts mediocrement et par degrez afin que si ils eussent perdu Leur mobilité, ils fussent rester courbez plustost que droits.

Mais heureusement Les ~~L'~~articulations s'~~es~~ont raffermies sans ankylose; Les os fracturés se sont consolidés, La peau s'est cicatrisée, et; (ce qui me paroist de plus remarquable de cette observation); L'union de toutes ces parties entr'elles a fourny, par une cicatrice commune, un point d'attache a chaque tendon; de sorte que Les mouvemens de flexion et d'extension, s'executent aujourd'huy dans toutes ces phalanges, presqu'avec La meme liberté qu'avant cet accident; Cette guerison s'est accomplie en six semaines. M. caumont

No. 58.